



Dr. Guido Castaldini

Cirurgia Ortopèdica i del Peu
Traumatologia i Artroscòpia

CIRUGIA PERCUTANEA HALLUX VALGUS

Será intervenido por cirugía percutánea del antepié con anestesia local.

Normalmente no precisa ingreso pudiendo ir a su casa tras la intervención, aunque es conveniente que acuda acompañado de algún familiar.

Después de la intervención debe tomar la siguiente medicación:

- RIGORAN 500 mg.1 / 12h durante 5 días.
- VOLTAREN 50 – 1comp.cada 8h. Durante 5 días.
- NOLOTIL – 1comp.cada 8h si tiene dolor.
- OMEPRAZOL 20mgr – 1comp al día, si gastritis.
- CLEXANE 40 1/día inyección subcutánea durante 10 días.

El día de la intervención precisará un zapato para juanetes liso, con cierres de “velcro”.

Es frecuente que presente a las 48h hematomas en los dedos de los pies, desaparecerán en unos días.

Se pondrá en contacto con la consulta para hacer la cura dentro de una semana. Deberá acudir con una Radiografía del pie realizada en las últimas 24 horas.

Este día precisará un separador interdigital tamaño mediano y una venda semiadhesiva tipo “COBAN” de 7,5 cm.

Si tiene cualquier duda no dude en llamarnos.

Dr. Guido Castaldini

Dr. Pablo Maciejczyk Boix